

SEGNALAZIONI FLORISTICHE PER LA VALLE DI SCALVE (Bergamo) IV Contributo

In base a ritrovamenti recenti ed a segnalazioni del passato, la famiglia delle *Pyrolaceae*, che in Italia annovera tre generi per complessive sette specie tra le quali alcune assai rare, risulta compiutamente rappresentata nella flora scalvina.

Pyrola minor L.

Reperto

Vilminore, pendii boscosi a N del paese, loc. Collegàl, m 1500 ca., radura ombrosa nella pecceta, localizzata, F. Tagliaferri (!), VIII.1988, VII.1989.

Osservazioni

Precedenti segnalazioni per la valle di Scalve si hanno in ROTA (1853) e in RODEGHER e VENANZI (1894).

Pyrola media Swartz

Reperti

Vilminore, valle del F. Povo, sopra Bueggio, m 1100 ca., radure nel bosco di Abete rosso, localizzata, F. Tagliaferri (!), VII.1987. Osservata anche in valle di Tino Secco, m. 1250 ca., F. Tagliaferri, VII.1989.

Osservazioni

Non conosciamo precedenti segnalazioni, né per la valle di Scalve né per la provincia di Bergamo. Le stazioni presentano interesse anche per la presenza di *Blechnum spicant*.

Pyrola chlorantha Swartz

Osservazioni

Segnalata per la valle di Scalve in ROTA (1853): «Schilpario», in RODEGHER e VENANZI (1894) e in UGOLINI (1898), ma non ritrovata di recente.

Pyrola rotundifolia L.

Reperti

Schilpario, nei pressi di M.ga Lifretto superiore (m. 1564), pecceta, lariceto,

cespuglieti, assai diffusa, F. Tagliaferri (!), VIII.1986.

Schilpario, a valle delle loc. «i Geroni», m 1500 ca., cespuglieto, assai diffusa, F. Tagliaferri (!), VI.1988.

Osservazioni

Già segnalata per la valle di Scalve (Schilpario) da ROTA (1853) e da RODEGHER e VENANZI (1894).

Orthilia secunda (L.) House

Reperti

Schilpario, valle di Ezendola, m 1300 ca., pecceta, F. Tagliaferri (!), VIII.1985.

Colere, Pian di Vione, m 1400 ca., cespuglieto, F. Tagliaferri (!), VIII.1986.

Schilpario, Campelli, ghiaioni sotto (NW) la Bagozza, m 1750 ca., tra i mughi, F. Tagliaferri (!), X.1987.

Osservazioni

Diffusa in valle di Scalve, è segnalata in BERGAMASCHI (1853), ROTA (1853), Rodegher e VENANZI (1894), WILCZEK et CHENEVARD (1912).

Moneses uniflora (L.) A. Gray

Reperti

Schilpario, nei pressi di M.ga Lifretto superiore (m 1564), bosco di aghifoglie, F. Tagliaferri (!), VII.1987.

Schilpario, a valle della loc. «i Geroni», m 1400 ca., cespuglieto, F. Tagliaferri (!), VI.1988. Osservata anche nei boschi di Azzone, loc. Negrino, m 1500 ca., F. Tagliaferri VII.1988.

Osservazioni

Precedentemente segnalata da ROTA (1853): «M. Venerocolo, Campelli...» e da RODEGHER e RODEGHER (1929): «Giogo della Presolana, ca. 1350 m (inf. da Chenevard)».

Monotropa hypopitys L.

Reperti

Schilpario, tra i Fondi e M.ga Lifretto inferiore, m 1300 ca., pecceta, F. Tagliaferri (!), VIII.1987.

Vilminore, pendii boscosi a N del paese, m 1300 ca., pecceta, F. Tagliaferri (!), VII.1989. Presente anche nelle peccete di valle di Tino, m 1300 ca., F. Tagliaferri, VIII.1989.

Osservazioni

Segnalata in ROTA (1853) e in RODEGHER e VENANZI (1894).

BIBLIOGRAFIA

- BERGAMASCHI G., 1853 - *Peregrinazione statistico-fitologica nelle valli Camonica, Seriana e Brembana*. Pavia.
- RODEGHER E. e VENANZI G., 1894 - *Prospetto della Flora della Prov. di Bergamo*. Stab. Tip. Sociale, Treviglio.
- RODEGHER E. e RODEGHER A., 1929 - *Flora della Prov. di Bergamo, III puntata*. Atti dell'Ateneo di Sc., Lett. e Arti Bergamo, a. 1927-29: 33-34.
- ROTA L., 1853 - *Prospetto della Fl. della prov. di Bergamo*. Tip. Mazzoleni, Bergamo.
- UGOLINI U., 1898 - *Elenco di piante del Bresciano, aggiunte al prospetto Zersi*. Comm. At. Brescia per l'anno 1897, Appendice: 1-56.
- WILCZEK E. et CHENEVARD P., 1912 - *Contributions à la flore des Prealpes bergamasques*. Ann. Cons. Jard. Bot., Genève, 15-16: 248-287.

FILIPPO TAGLIAFERRI
via Tosio, 15
25121 BRESCIA