

FRANCO FENAROLI*

**SEGNALAZIONI FLORISTICHE
PER IL TERRITORIO BRESCIANO: 80-102**

80. *Dryopteris affinis* (Lowe) Fr.-Jenk. (Aspidiaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Media Val Camonica orientale (5d-98284)¹, comune di Savio, tra loc. Fabrezza ed il L. di Macesso, bosco di Abete rosso, m 1850 s.l.m., 6.VII.1991, F. Martini, HbFF (Erbario Fenaroli Franco).

Osservazioni

La specie fu precedentemente segnalata per il Bresciano da FENAROLI (1926) e da GIACOMINI (1950).

81. *Anemone coronaria* L. (Ranunculaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte occidentale bresciano (5g-04271), comune di Cellatica, presso loc. «I Ronchettini», prati al bordo di un Carpineto, m 180 s.l.m., 2.IV.1991, R. Frassine, HbFF.

Osservazioni

La specie, segnalata per il Bresciano da ZERSI (1871), UGOLINI (1924), GIACOMINI (1950), ARIETTI (1981) e PIGNATTI (1982), è pianta naturalizzata e normalmente effi-

* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

¹ Tra parentesi sono riportati: la sigla che identifica la sottoregione fisica in cui è suddivisa la provincia di Brescia (FENAROLI e TAGLIAFERRI, 1992) e il numero del quadrante desunto dal Programma di Rilevamento della Flora dell'Europa media (EHRENDORFER und HAMANN, 1965).

mera. Nella località indicata, al contrario, *Anemone coronaria* fiorisce da molti anni ed è ben nota agli abitanti del luogo.

82. **Erysimum odoratum** Ehrh. (Cruciferae)

Nuove stazioni per il Bresciano.

Reperti

Pedemonte bresciano orientale (5h-04274), comune di Brescia, versante meridionale del M. Maddalena sulla cresta SW, pascoli aridi su suolo calcareo, m 830 s.l.m., 10.VI.1991, F. Martini, HbFF.

Pedemonte bresciano occidentale (5g-03263), comune di Provaglio d'Iseo, versante SW del M. Madonnina, ghiaioni calcarei, m 200 s.l.m., 24.VI.1992, F. Martini, HbFF.

Osservazioni

Per il Bresciano la specie risulta segnalata sub *Cheiranthus erysimoides* L. (che FIORI 1923-1929 dubitativamente pone in sinonimia con *Erysimum odoratum* Ehrh.), da POLLINI (1822-1824) e da LANFOSSI (1836b); CHENEVARD (s. d.) riprende una segnalazione di BERGAMASCHI (1853) di *Erysimum lanceolatum* Ait. (secondo FIORI 1923-1929, *Erysimum lanceolatum* R. Br. è sinonimo di *Erysimum sylvestre* Scop.). I petali, chiaramente pelosi sulla faccia esterna, escludono confusione con *Erysimum virgatum*.

83. **Saxifraga muscoides** All. (Saxifragaceae)

Riaccertamento e precisazione di località per il Bresciano.

Reperto

Alta Val Camonica (5a-97291), comune di Ponte di Legno, tra il P.so dei Contrabbandieri e Punta di Albiolo, sulla cresta e canali ghiaiosi del versante ESE, m 2810 s.l.m., 9.VIII.1991, C. Tonni-Bazza e R. Frassine, HbFF.

Osservazioni

Segnalata nel Bresciano da ZERSI (1871) per il M. Gazzo, la specie non è presente nel suo erbario. L'indicazione di ROTA (1843, 1853) per il Tonale, ripresa da tutti gli Autori successivi, dovrebbe coincidere con l'attuale scoperta.

84. **Vicia grandiflora** Scop. (Leguminosae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte bresciano occidentale (5g-04271), comune di Brescia, cresta sommi-

tale del M. Picastello, boschetti a ceduo e siepi, m 360 s.l.m., 8.VI.1991, F. Fenaroli e F. Martini, HbFF.

Osservazioni

Recentemente segnalata da ZANOTTI (1988, 1991), questo reperto risulta essere la seconda segnalazione per il territorio bresciano.

85. **Viola mirabilis** L. (Violaceae)

Nuove stazioni per il Bresciano.

Reperti

Val Sabbia (5h-03284), comune di Gavardo, sul M. Magno di Gavardo presso loc. Quarena, boschi luminosi a ceduo, m 450 s.l.m., 18.III.1992, R. Frassine e C. Tonni-Bazza, HbFF.

Val Trompia (5g-02274), comune di Marmentino, Val Agola, radure luminose dei boschi di latifoglie, m 700 s.l.m., 10.V.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Viola mirabilis, già segnalata per il Bresciano da HAMANN e LUDWIG (1983) e HAMANN (1985), è specie abbastanza comune e fino ad ora sfuggita all'osservazione o scambiata con le specie vicine.

86. **Seseli montanum** L. (Umbelliferae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte bresciano orientale (5h-04274), comune di Brescia, versante S del M. Maddalena sopra loc. Giudici, prati aridi a *Bromus* sp. pl. e *Stipa* sp. pl., m 650 s.l.m., 10.VI.1991, F. Martini, HbFF.

Osservazioni

La specie, assai rara nel territorio bresciano, è stata segnalata da LANFOSSI (1836a), ZERSI (1871), PARLATORE (1848-1896), GOIRAN (1897-1900), UGOLINI (1907) e ARIETTI (1981).

87. **Trochiscanthes nodiflora** (All.) Koch (Umbelliferae)

Riaccertamento di località per il Bresciano.

Reperto

Valvestino (5i-02291), comune di Valvestino, sul versante orientale di «Le Frat-

te» tra Persone e Moerna, schiarite di un bosco misto con prevalenza di Faggio, m 940 s.l.m., 13.VI.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Viene riconfermata la stazione scoperta da PORTA nel 1906 in FIORI, BEGUINOT e PAMPANINI (1907). Le segnalazioni di CASTELLI (1897) per la Val di Scalve e di OBERLI (1964) per la Val di Sur sopra Gardone Riviera, nonostante le diligenti ricerche fino ad ora condotte, non hanno trovato conferma.

88. *Galium laevigatum* L. (Rubiaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperto

Sebino orientale (5e-02262), comune di Zone, tra il P.so Croce di Zone e M.ga Aguina, bosco misto di latifoglie con prevalenza di Faggio, m 950 s.l.m., 20.VI.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Galium laevigatum è una rubiaceae con fusto erbaceo tetragono, esile, verde e risulta scarsamente differenziato rispetto all'affine *Galium aristatum*, ripetutamente segnalato per il territorio bresciano. La presenza di stoloni sotterranei, radicanti ai nodi, è un carattere realmente discriminante. *Galium aristatum* è stato recentemente osservato nei boschi a caducifoglie nei pressi di Lodrino e di Moerna.

Dopo questi ritrovamenti la distribuzione nel Bresciano delle due specie rimane oggi praticamente sconosciuta e va ridefinita mediante attente ricerche di campagna.

89. *Galium schultesii* Vest (Rubiaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Val Trompia (5g-02274), comune di Marmentino, nella Val Agola lungo il sentiero diretto verso M.ga Agola, bosco misto di caducifoglie, m 700 s.l.m., 10.V.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

La specie venne segnalata la prima volta da HAMANN (1985) per la Valle di Campiglio, sopra Toscolano. *Galium schultesii*, che ha fusto subrotondo ed arrossato in basso, decisamente tetragono e verde nella metà superiore; è pianta fortemente glauca, robusta e con lunghi stoloni basali radicanti ai nodi.

L'affine *Galium sylvaticum*, recentemente scoperto nei boschetti termofili della collina di S. Rocco presso Cellatica, ha tutto il fusto subrotondo, robusto, verde, glaucescente, fortemente ingrossato ai nodi, assolutamente privo di stoloni.

90. **Galium obliquum** Vill. (Rubiaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Bassa Val Camonica orientale (5e-00283), comune di Prestine, pendici SW di M. Trabucco, localizzato in prati aridi sassosi al bordo di una mulattiera, m 1680 s.l.m., 8.VIII.1991, F. Fenaroli e F. Martini, HbFF.

Osservazioni

La specie risulta segnalata per il territorio bresciano da PARLATORE (1848-1896), CHENEVARD (s. d.) e PAVESIO (1958). Rispetto all'affine *Galium rubrum* abbiamo osservato alcuni importanti caratteri differenziali: base del fusto con evidenti asperità rivolte verso il basso, rami inferiori molto allungati e corolla rosso-giallastra.

91. **Glechoma hirsuta** W. et K. (Labiatae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Colli morenici del Benaco (8c-04291), comune di Manerba del Garda, versante orientale di M. Re, schiarite erbose al piede del quercu-carpineto, m 130 s.l.m., F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Per il territorio bresciano la specie era stata indicata solo da HAMANN (1985) in Valvestino tra Turano e Magasa.

92. **Rhinanthus facchinii** Chab. (Scrophulariaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperto

Media Val Camonica orientale (5d-99282), comune di Savio, Valle di Salarno presso affioramenti calcarei posti ad ENE del L. di Bos, lembi prativi di un pendio ghiaioso lungamente innevato, m 2300 s.l.m., 26.VII.1992, F. Fenaroli e C. Tonni-Bazza, HbFF e HbTF (Erbario Tagliaferri Filippo).

Osservazioni

I campioni raccolti appaiono caratterizzati da un fusto semplice di 5-15 cm, corolla a fauce nettamente aperta e calice con lunghi peli più radi che in *Rhinanthus alectorolophus*.

93. **Orobanche ramosa** L. subsp. **ramosa** (Orobanchaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte bresciano occidentale (5g-04271), comune di Cellatica, versante S della collina di S. Rocco, scarpata incolta su ferretto, m 155 s.l.m., R. Frassine, HbFF.

Osservazioni

La specie, anticamente segnalata da CESATI in SOLDANO (1987), LANFOSSI (1836b) e ZERSI (1871), mancava di recenti conferme.

94. **Inula montana** L. (Compositae)

Riaccertamento di località per il Bresciano.

Reperto

Pianura bresciana occidentale (8a-04252), comune di Cologne, versante meridionale del Montorfano, prati aridi sotto la cresta esposti a SW, m 320 s.l.m., 24.VI.1992, F. Martini, HbFF.

Osservazioni

La stazione bresciana di *Inula montana*, scoperta da DUBI-CORTIVALLO (1960) e ripresa da HESS, LANDOLT e HIRZEL (1972-1977), trova conferma con l'attuale ritrovamento.

95. **Dactylis polygama** Horvatovsky (Graminaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte occidentale bresciano (5g-04271), comune di Brescia, versante S del M. Picastello sopra la fraz. Urago Mella, all'interno di un bosco maturo di Rovere, m 170 s.l.m., 5.VI.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Raccolta anche in Valvestino nei boschi tra Persone e Moerna (HbFF). *Dactylis polygama*, nelle due sole località indicate, appare realmente differenziata rispetto a *Dactylis glomerata* per avere glume pellucide, tenui, di colore giallo-verdastro e lisce sul dorso, con antere gialle. In tutti gli altri boschi di latifoglie del Bresciano in cui abbiamo ricercato la specie appaiono popolazioni con caratteri intermedi, probabili forme originarie da introgressione con *Dactylis glomerata*, di impossibile assegnazione. Non tutti gli Autori sono concordi nel ritenere questa entità realmente differenziata rispetto a *Dactylis glomerata*.

96. **Bromus ramosus** Hudson (Graminaceae)

Nuove stazioni per il Bresciano.

Reperti

Pedemonte occidentale bresciano (5g-04271), comune di Collebeato, versante meridionale del M. Peso, boscaglia mista in ambiente umido presso un ruscello con *Carex pendula*, m 250 s.l.m., 14.V.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Benaco nord-occidentale (5i1-03291), comune di Gardone Riviera, Valle di Sur, al bordo di un bosco umido e ombroso, m 560 s.l.m., 18.VII.1992, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

Per il territorio bresciano *Bromus ramosus* fu segnalato da CESATI in SOLDANO (1987), AMBROSI (1853), ZERSI (1871), BALL (1896), DALLA TORRE e SARNTHEIN (1900-1913) e ARIETTI (1944). La specie non è presente in Hb Zersi ed in Hb Arietti.

97. **Bromus rigidus** Roth (Graminaceae)

Nuova stazione per il bresciano.

Reperto

Pianura bresciana occidentale (8a-04262), comune di Rodengo Saiano, tra loc. Moie di sotto e loc. Buca, incolto arido al bordo di coltivi, m 150 s.l.m., 26.V.1992, F. Fenaroli, HbFF e HbTF.

Osservazioni

Per il territorio bresciano la specie ha segnalazioni molto antiche. *Bromus rigidus* non è presente in Hb Arietti; nell'Hb Zersi il campione depositato (sub *Bromus maximus* Desf. = *Bromus rigidus* Roth) va riferito a *Bromus gussonei* che appare comunissimo negli incolti e bordi di strada del Bresciano.

98. **Stipa tirsia** Steven (Graminaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Pedemonte bresciano orientale (5h-04274), comune di Brescia, versante S del M. Maddalena presso loc. Giudici, prati aridi, m 580 s.l.m., 10.VI.1991, F. Martini, HbFF.

Osservazioni

La specie era stata segnalata in precedenza per il Bresciano da MORALDO (1986).

99. **Carex rosae** (Gilomen) Hess et Landolt (Cyperaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperto

Bassa Val Camonica orientale (5e-00283), comune di Breno, versante orografico destro della conca glaciale posta ad W della cima del M. Frerone, esteso curvuleto in presenza di rocce calcaree affioranti, m 2540 s.l.m., 4.VIII.1991, F. Fenaroli e F. Martini, HbFF.

Osservazioni

Gli esemplari raccolti nel Bresciano sono stati confrontati con reperti depositati presso l'Herbarium Pedemontanum di Torino. Ringrazio la Prof. G. Dal Vesco che mi ha gentilmente aiutato durante il controllo e confronto delle sezioni delle lamine fogliari.

100. **Carex ornithopodioides** Hausm. (Cyperaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperto

Media Val Camonica orientale (5d-99282), comune di Saviore, Valle di Salarno presso affioramenti calcarei posti a ENE del L. di Bos, pendio ghiaioso, al piede di una conca nivale su piccoli massi franati, m 2200 s.l.m., 26.VII.1992, F. Fenaroli e C. Tonni-Bazza, HbFF e HbTF.

Osservazioni

Nelle immediate vicinanze del reperto abbiamo osservato *Arenaria ciliata*, *Carex capillaris*, *Carex mucronata*, *Carex rupestris*, *Chamaeorchis alpina*, *Elyna myosuroides*, *Galium baldense*, *Primula glaucescens* e *Veronica aphylla*.

101. **Listera cordata** (L.) R. Br. (Orchidaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Valle di Caffaro (5h-00283), comune di Bagolino, nei pressi dei Laghi di Brufione, cespugli di Mirtillo e Rododendro, m 2000 s.l.m., 24.VIII.1991, A. e G. Bedoschi, HbFF.

Osservazioni

Questo ritrovamento risulta essere la prima segnalazione della specie per la Val Sabbia.

102. *Spiranthes aestivalis* (Lam.) L. C. Rich. (Orchidaceae)

Nuova stazione per il Bresciano.

Reperto

Colli morenici del Benaco (8c-04293), comune di Moniga del Garda, presso loc. Balosse in sito detto «I Ballerini», prato torboso, m 130 s.l.m., 6.VII.1991, A. e G. Bedoschi, HbFF.

Osservazioni

Spiranthes aestivalis fu indicata da ZERSI (1871) per le «lame» di Bagnolo e confermata da un campione depositato nel suo Erbario. GIACOMINI (1946) e ZANOTTI (1991) riprendono la segnalazione di Zersi. Nelle vicinanze dell'ambiente di crescita di *Spiranthes aestivalis* abbiamo potuto osservare *Carex davalliana*, *Carex oederi* ed *Orchis laxiflora*. Al bordo dei fossi non è rara *Carex otrubae*, osservata anche presso la Rocca di Manerba e Sirmione.

B I B L I O G R A F I A

- AMBROSI F., 1853 - *Flora von Südtirol*. Öst. Bot. Wochenbl. III.
- ARIETTI N., 1944 - *La flora della Valle Camonica. Revisione critico-sistemica di un erbario e di note inedite di Ottone Penzig predisposti per un incompiuto catalogo delle piante vascolari della Valle Camonica*. Atti Ist. Bot. Lab. Crittogam. Univ. Pavia, s. 5, IV (1): 1-181.
- ARIETTI N., 1981 - *L'opera botanica di Francesco Roncalli Parolino: il «Plantarum in agro brixiano situs, et vires» in «Europae medicina a sapientibus illustrata» (Brixiae 1747)*. Monografie di «Natura Bresciana» 4: 1-103.
- ARIETTI N. e CRESCINI A., 1980 - *Recenti avventizie della flora bresciana. Seconda contribuzione*. Natura Bresciana, 16: 24-51.
- BALL J., 1896 - *The distribution of plants on the south side of the Alps*. Trans. Linn. Soc. London. Ser. 2, Bot., V (4): 119-227.
- BERGAMASCHI G., 1853 - *Peregrinazione statistico-fitologica fatta dal dottor Bergamaschi nelle valli Camonica, Seriana, Brembana*. Tip. eredi Bizzoni, Pavia: 1-116.
- CASTELLI G., 1897 - *La Valle di Scalve*. Boll. Club Alp. Ital., XXX (67): 61-137.
- CHENEVARD P., s. d. - *Flora delle Prealpi bergamasche*. Manoscritto inedito. Biblioteca del Conservaire et Jardin botanique de la Ville de Genève.
- DALLA TORRE K. W. e SARNTHEIN L. G., 1900-1913 - *Flora der Gefürsteten Grafschaft Tirol des Landes Vorarlberg und des Fürstenthumes Liechtenstein*. Ripr. facs. dell'ed. orig. A. Forni, Bologna, 9 vol.
- DUBI-CORTIVALLO H., 1960 - *Appunti sulla flora insubrica. Seconda serie*. Boll. Soc. Ticin. Sci. Nat., LIII: 11-37.
- EHRENDORFER R. und HAMANN U., 1965 - *Vorschläge zu einer floristischen von Mitteleuropa*. Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50.
- FENAROLI L., 1926 - *La flora della Conca del Baitone (Val Camonica-Gruppo dell'Adamello)*. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civ. St. Nat. Milano, LXV (1): 16-24.
- FENAROLI F. e TAGLIAFERRI F., *Le segnalazioni floristiche del territorio bresciano*. In: FENAROLI F., TAGLIAFERRI F. e ZANOTTI E., *Il Gruppo Bresciano di Ricerca Floristica*. Natura Bresciana, 27: 60-63.
- FIORI A., 1923-1929 - *Nuova flora analitica d'Italia, contenente la descrizione delle piante vascolari indigene inselvatichite e largamente coltivate in Italia*. M. Ricci, Firenze, 2 vol.

- FIORI A., BEGUINOT A. e PAMPANINI R., 1907 - *Schedae ad floram italicam exsiccatae. Centuriae VI-VII.* Nuovo G. Bot. Ital., n. s., XIV (2): 69-116.
- GIACOMINI V., 1946 - *Aspetti scomparsi e relitti della vegetazione padana: documenti sulla vegetazione recente delle «lame» e delle torbiere fra l'Oglio ed il Mincio.* Atti Ist. Bot. Lab. Crittogam. Univ. Pavia, s. 5, IX: 29-123.
- GIACOMINI V., 1950 - *Contributo alla conoscenza della flora lombarda. (Con osservazioni sistematiche e fitogeografiche).* Atti Ist. Bot. Lab. Crittogam. Univ. Pavia, s. 5, IX (2): 129-188.
- GOIRAN A., 1897-1900 - *Le piante fanerogame dell'agro veronese. Censimento.* Franchini, Verona, 2 vol.
- HAMANN U., 1985 - *Botanische Exkursionen im Gardaseegebiet und in den Judikarischen Alpen aus Exkursionsprotokollen von 1958 bis 1983.* Ruhr-Universität, Spezielle Botanik, Bochum: 1-111.
- HAMANN U. e LUDWIG D., 1983 - *Bericht über die Botanische Exkursion in das Gardasee-Gebiet und in die Judikarischen Alpen vom 29.5. bis 11.6.1983.* Ruhr-Universität, Spezielle Botanik, Bochum: 1-31.
- HESS H. E., LANDOLT E. e HIRZEL R., 1967-1972 - *Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete.* Birkhäuser, Basel & Stuttgart, 3 v.
- LANFOSSI P., 1836a - *Catalogo delle piante vedute crescere spontaneamente nei territori milanese, valtellinese e bresciano.* Il Poligrafo, 5-6: 147-176.
- LANFOSSI P., 1836b - *Catalogo delle piante vedute crescere spontaneamente nei territori milanese, valtellinese e bresciano. Continuazione.* Il Poligrafo, 7: 30-50.
- MORALDO B., 1986 - *Il genere Stipa L. (Gramineae) in Italia.* Webbia, 40 (2): 203-278.
- OBERL H., 1964 - *Ferien in Gargnano s. Garda, 15-30 Juli 1963. Herbarbelege (mit Nummern) und floristische Notizen.* Dattiloscritto inedito.
- PARLATORE F., 1848-1896 - *Flora italiana, ossia, descrizione delle piante che crescono spontaneamente o vegetano come tali in Italia e nelle isole ad essa aggiacenti.* Le Monnier, Firenze, 11 vol.
- PAVESIO A., 1958 - *Studi di botanica in Brescia.* In: *Atti del terzo convegno di studi AISF, Genova, 28-29 settembre 1957.* Pacini Mariotti, Pisa: 161-166.
- PIGNATTI S., 1982 - *Flora d'Italia.* Edagricole, Bologna, 3 vol.
- POLLINI C., 1822-1824 - *Flora veronensis quam in prodrum florum Italiae septentrionalis.* Typis et expensis Societatis typographicae, Veronae, 3 vol.
- ROTA L., 1843 - *Enumerazione delle piante fanerogame rare ritrovate nella Provincia di Bergamo.* Tip. Fusi, Pavia: 1-38.
- ROTA L., 1853 - *Prospetto della flora della Provincia di Bergamo.* Dalla Tip. Mazzoleni, Bergamo: 1-104.
- SOLDANO A., 1987 - *L'attività scientifica di Vincenzo Cesati nel Bresciano (1843-1847).* Natura Bresciana, 23: 141-163.
- UGOLINI U., 1907 - *Secondo contributo alla florula arboricola della Lombardia e del Veneto.* Comment. Ateneo Sci. Lett. Arti Brescia, a. 1907: 142-147.
- UGOLINI U., 1924 - *Piante non comuni raccolte a Sirmione.* Tip. de La Provincia di Brescia, Brescia: 1-3.
- ZANOTTI E., 1988 - *Segnalazioni floristiche per la pianura bresciana.* Natura Bresciana, 24: 91-97.
- ZANOTTI E., 1991 - *Flora della pianura bresciana centro-occidentale. Comprensiva delle zone golenali bergamasche e cremonesi del corso medio del fiume Oglio.* Monografie di «Natura Bresciana», 16: 1-203.
- ZERSI E., 1871 - *Prospetto delle piante vascolari spontanee o comunque coltivate nella Provincia di Brescia aggiunte le esotiche che hanno uso e nome volgare disposte in famiglie naturali.* Tip. di F. Apollonio, Brescia: 1-267.

Indirizzo dell'Autore:

FRANCO FENAROLI, via F. Canevali 10 - 25126 BRESCIA