

ALESSANDRO MICHELI* e MAURIZIO BUSETTO*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1986-1988 e 1989

RIASSUNTO - Il presente articolo elenca le segnalazioni di specie ornitiche più interessanti della provincia di Brescia, relative agli anni 1986-1988 compresi, e 1989. Sono escluse da tale rapporto notizie riguardanti le nidificazioni, gli svernamenti già compresi nei rispettivi Atlanti 1984-85; 1987-88 e i dati già pubblicati su riviste specialistiche.

SUMMARY - *1986-1989 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy)*. This paper deals with the more interesting bird species observed between 1986 and 1989 in the province of Brescia. The article does not include the wintering and breeding species already reported from other journals.

PREMESSA

Viene qui presentato per la prima volta un resoconto delle osservazioni ornitologiche effettuate nel Bresciano, relative a svernamento, estivazione, migrazione, comportamento e anomalie di piumaggio.

Le segnalazioni elencate sono state selezionate in base alla loro significatività riguardo alle categorie suddette. La sintesi è stata suddivisa in due parti, di cui la prima (1986-1988) ha lo scopo di recuperare alcuni dati importanti che non rientravano negli Atlanti provinciali o non erano pubblicati su riviste specialistiche. Inoltre sono state aggiunte alcune notizie maggiormente circostanziate, che riguardano ricatture di soggetti inanellati.

Scopo principale della pubblicazione è quello di raccogliere, vagliare e conservare notizie e dati evitandone la perdita o la «polverizzazione» su riviste più o meno specialistiche; vengono così facilitati eventuali lavori di sintesi su specie o aree geografiche. È nelle nostre intenzioni, a partire dal 1990, di redigere anno per anno il relativo resoconto; si invitano perciò i potenziali collaboratori ad inviare i dati in loro possesso entro il 31 gennaio di ogni anno. Un doveroso ringraziamento va a tutti i collaboratori che hanno fornito notizie, al Museo Civico di Scienze Naturali e all'amico Pierandrea Brichetti, che ha messo a disposizione la sua esperienza per l'impostazione del lavoro e la valutazione delle notizie.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni, 23 persone che elenchiamo qui di seguito con i rispettivi luoghi di residenza: Mauro Bailo (Bagnolo Mella, Brescia), Guido Ballerio (Brescia), Giuseppe Barbieri (Volongo, Cremona), Roberto Bertoli (Torbole Casaglia, Brescia), Pierandrea Brichetti (Verolavecchia, Brescia), Maurizio Busetto (Concesio, Brescia), Carlo Chiari (Brescia), Pie-

* GRA, Gruppo Ricerche Avifauna, Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

ralberto Cucchi (Barghe, Brescia), Enzo Galdi (Brescia), Arturo Gargioni (Gottolengo, Brescia), Armando Gariboldi (Pavia), Battista Ghidotti (Tremosine, Brescia), Rocco Leo (Bovezzo, Brescia), Angiolino Marchesi (Brescia), Paolo Mazzoldi (Brescia), Sergio Mazzotti (Coccaglio, Brescia), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano, Brescia), Agostino Pedrali (Coccaglio, Brescia), Gabriele Piotti (Salò, Brescia), Mario Rizzardini (Agnosine, Brescia), Alessandro Rossi (Desenzano, Brescia), Massimo Rossi-Erba (Brescia), Mario Tacconi (Pozzolengo, Brescia).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PHALACROCORACIDAE

Cormorano *Phalacrocorax carbo*: 5 ind. si sono trattenuti durante i mesi di giugno e luglio 1988 nella R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.). Il 10 settembre sono stati contati 6 ind. (Gargioni A.). Si tratta del primo caso di estivazione per il bacino del Sebino.

ARDEIDAE

Tarabuso *Botaurus stellaris*: 1 ind. a Remedello Sopra il 30 dicembre 1987 (Barbieri G.); l'anno successivo (30 dicembre 1988) è stato trovato un altro ind. svernante in un canneto perilacustre a Punta Gro (Sirmione) (Micheli A.).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*: l'unica segnalazione riguarda 1 ind. trovato nella R.N. Torbiere d'Iseo, il 26 aprile 1988 (Mazzotti S.).

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: 1 ind. osservato il 9 novembre 1986 insieme a 30 Aironi cenerini *Ardea cinerea* presso un allevamento ittico a Calvisano (Gargioni A.).

Airone cenerino *Ardea cinerea*: un gruppo di 50 ind. in transito sulla R.N. Torbiere d'Iseo, il 30 marzo 1988 (Mazzotti S.).

ANATIDAE

Oca lombardella *Anser albifrons*: un'osservazione tardiva (18 maggio 1986) di 1 ind. di questa specie è stata effettuata nella R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.).

Oca selvatica *Anser anser*: inusuale, sia per il periodo (27 maggio 1986) sia per la provenienza geografica, l'avvistamento di un soggetto attribuito alla subsp. *rubrirostris* (Oca selvatica orientale) a Remedello Sotto (Barbieri G.).

Edredone *Somateria mollissima*: 2 juv. hanno sostato a lungo sul lago a Provaglio d'Iseo, durante i mesi ottobre e novembre 1988 (Ballerio G.). Altri 2 ind. sono stati visti sul lago di Garda, a Sirmione, il 21 settembre 1988 (Rossi A.). Avvistamenti in tale periodo si sono avuti in tutta l'Italia settentrionale.

Moretta codona *Clangula hyemalis*: 1 ♀ di questa specie, di comparsa rara ed irregolare, è stata osservata per tre giorni (13, 14 e 15 dicembre 1988) a Toscolano-Maderno (Piotti G.).

Orchetto marino *Melanitta nigra*: 8 ind. (4 ♂♂ e 4 ♀♀) avvistati sul lago d'Iseo il 15 aprile 1988. Per questo bacino risulta essere il primo gruppo di individui segnalato (Mazzotti S.).

ACCIPITRIDAE

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*: 1 ind. raccolto a Remedello Sotto il giorno 11 dicembre 1986. Probabilmente si trattava di un soggetto attardatosi poiché incapace di intraprendere la regolare migrazione (Barbieri G.).

Nibbio bruno *Milvus migrans*: ben 48 ind. osservati il 16 agosto 1988 volteggiare per mezz'ora in uno spettacolare carosello, nella sponda NE del lago d'Idro, al confine col Trentino Alto Adige (Micheli A.).

Nibbio reale *Milvus milvus*: fotografato 1 ind. il 7 agosto 1988 a Carpenedolo: molto probabilmente era 1 juv. erratico (Barbieri G.). È la quinta segnalazione degli ultimi vent'anni (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

Sparviere *Accipiter nisus*: 1 ♀ ha svernato dal 28 ottobre 1988 al marzo 1989 all'interno di una «zona di ripopolamento e cattura», tra Gottolengo, Gambara e Pralboino (Gargioni A.).

Poiana *Buteo buteo*: 1 ind., ripreso ad Iseo il giorno 8 novembre 1980, era stato inanellato da pullus il 12 giugno dello stesso anno a Kėdainiai, in Lituania, n. 145271 (Ballerio G.).

Poiana calzata *Buteo lagopus*: il 3 marzo 1987 è stato visto 1 ind. posato su un albero, all'interno della R.N. Torbiere d'Iseo (Mazzotti S.).

Falco di palude *Circus aeruginosus*: il giorno 11 ottobre 1985 è stata raccolta 1 ♀ ferita da arma da fuoco, nell'anfiteatro morenico meridionale del Garda, inanellata in Cecoslovacchia (n. Museum Praga D 88533). Il soggetto è stato poi inviato al centro recupero rapaci L.I.P.U. di Parma (Busetto M.).

FALCONIDAE

Falco cuculo *Falco vespertinus*: due osservazioni tardo primaverili nella bassa pianura: il 4 giugno 1987, visto 1 ♂ subadulto posato sui cavi di un elettrodotto a Gottolengo, quindi 1 juv. appostato su un pioppo presso il F. Chiese, a Calvisano, l'8 giugno 1987 (Gargioni A.). Di notevole interesse l'osservazione di 1 ♂ il 5 settembre dello stesso anno, a 1700 m di quota, presso il rifugio Bonardi sul Maniva (Marchesi A.).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*: l'unica segnalazione è riferita ad 1 ind. in volo lungo le falesie del lago d'Iseo, il 19 novembre 1988 (Mazzotti S.).

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: 1 ind. isolato ha sostato tre giorni (15, 16 e 17 marzo 1988) presso una tesa sul F. Mella, tra Bagnolo e Capriano (Bailo M.). Molto rara è la sosta nel nostro territorio.

RECURVIROSTRIDAE

Avocetta *Recurvirostra avosetta*: molto sporadiche le osservazioni di questa specie nella nostra provincia: questa risale al 24 maggio 1986, quando 3 ind. sono capitati in una «tesa» della bassa pianura orientale, a Remedello Sotto (Barbieri G.).



Fig. 1 - Piovanello tridattilo *Calidris alba*: Sirmione, settembre 1988 (foto Rossi A.).



Fig. 2 - Piovanello tridattilo *Calidris alba*: Sirmione, settembre 1988 (foto Rossi A.).

SCOLOPACIDAE

Piovanello tridattilo *Calidris alba*: segnalato nel 1988 su entrambi i laghi maggiori: il 10 settembre, 7 ind. sulla sponda meridionale del lago d'Iseo (Mazzotti S.) mentre altri 2, il 16 settembre sulla costa benacense a Sirmione, poi 1 ind. il 21 settembre e quindi 3 il giorno successivo (figg. 1-2) (Rossi A.).

Pittima minore *Limosa lapponica*: la scarsità di notizie su questa specie per la nostra provincia rende particolarmente interessante la sosta di due giorni (16-17 settembre 1988) effettuata da un gruppetto di 4 ind. su una spiaggia presso Sirmione (figg. 3-4) (Rossi A.).

Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius*: 1 ind. in abito invernale trovato morto a Ciliverghe nell'aprile 1987 (Brichetti P.). È la terza segnalazione per il Bresciano (BRICHETTI, 1982).

LARIDAE

Gabbiano comune *Larus ridibundus*: 1 ind., ferito da arma da fuoco, raccolto a Desenzano; era stato inanellato a Danzica (Rossi Erba M.).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*: osservati 3 ind. ancora in abito invernale il 13 maggio 1986, lungo il F. Gambara, a Gambara (Gargioni A.).

APODIDAE

Rondone pallido *Apus pallidus*: 1 ind. isolato in migrazione visto il 9 ottobre 1988 su un valico montano ad Anfo, Val Sabbia (Micheli A.). Le segnalazioni note antecedenti questa sono solo due (BRICHETTI, 1982).

ALCEDINIDAE

Martin pescatore *Alcedo atthis*: 1 ind. è stato osservato il 9 settembre 1988, presso un laghetto alpino ricco di girini di *Rana temporaria*, nella valle di Campovecchio (Corteno Golgi), a 2300 m (Mazzoldi P.). Nonostante la precarietà della presenza, la quota altimetrica è una delle più alte mai riscontrate per questa specie.

PICIDAE

Torcicollo *Jynx torquilla*: il 4 dicembre 1988 è stato notato 1 ind. posato a terra, in una boscaglia submediterranea rada, a Toscolano-Maderno (Piotti G.). Potrebbe trattarsi di un occasionale caso di svernamento nell'Italia settentrionale, determinato dal clima mite del settore benacense.

ALAUDIDAE

Allodola *Alauda arvensis*: il 24 gennaio 1988 è stato rilevato 1 ind. in canto nuziale aereo nella pianura occidentale, a Ospitaletto (Busetto M.).

HIRUNDINIDAE

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*: un unico stormo di 100-120 ind. in migrazione osservato sul M. Alto (Adro) il 16 ottobre 1987 (Mazzotti S.).



Fig. 3 - Pittime minori *Limosa lapponica*: Sirmione, settembre 1988 (foto Rossi A.).



Fig. 4 - Pittime minori *Limosa lapponica*: Sirmione, settembre 1988 (foto Rossi A.).

Rondine *Hirundo rustica*: 1 ind. in volo radente su un canneto perilacustre a punta Gro (Sirmione) il 28 novembre 1986 (Rossi A.).

BOMBYCILLIDAE

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*: la segnalazione dei primi arrivi dell'invasione dell'inverno 1988-89 riguarda 1 ind., imbrancato con Cesene *Turdus pilaris* e Storni *Sturnus vulgaris*, intento a nutrirsi di frutti di *Diospyrus kaki*, nel dicembre 1988, a Verolavecchia (Brichetti P.).

TURDIDAE

Pettazzurro *Luscinia svecica*: osservato 1 ind. della subsp. *cyaneacula*, sulla strada vecchia all'interno della R.N. Torbiere d'Iseo, il 9 aprile 1986 (Bailo M.). Ulteriore osservazione di 1 ind. posato su un arbusto di *Salix* il 6 aprile 1987 sul greto del F. Oglio a Bompensiero di Villachiara (Mazzotti S.). Questa specie viene raramente notata durante le sue migrazioni attraverso il nostro territorio.

SYLVIIDAE

Pagliarolo *Acrocephalus paludicola*: notato per due giorni consecutivi 1 ind. in un lembo di canneto ai bordi di un allevamento ittico a Calvisano, il 9 settembre 1987 (Gargioni A.). In provincia la specie è di comparsa occasionale durante le migrazioni e mancavano segnalazioni da parecchi anni.

MUSCICAPIDAE

Balia nera *Ficedula hypoleuca*: degno di nota il ritrovamento di 1 ind. a Iseo il 30 agosto 1988, inanellato a Kuhmalahti, Finlandia, n. V 682555, il 27 giugno 1988 (Ballerio G.). Nell'arco di due mesi e tre giorni l'uccello si era spostato a SW di 2009 Km.

CORVIDAE

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*: il 5 settembre 1986 è stato notato un consistente assembramento di 25 ind. sul M. Orfano, un rilievo miocenico isolato nell'alta pianura bresciana occidentale; tali comparse sono dovute al locale movimento migratorio a corto raggio che si registra periodicamente sull'arco alpino. 1 ind. isolato è stato avvistato anche in pieno periodo riproduttivo, il 6 giugno 1987, sul M. Alto presso Adro (Mazzotti S.).

EMBERIZIDAE

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus*: 1 ind. è stato avvistato, durante la migrazione tardo-autunnale, in un campo arato, a Iseo, il 14 novembre 1987 (Ballerio G.). Solitamente le segnalazioni di questa specie riguardano il settore orientale della provincia.

Zigolo nero *Emberiza cirulus*: il 19 novembre 1986, data tardiva, osservato 1 ind. posato su un pioppo presso punta Gro (Sirmione) (Rossi A.). Nel luglio 1988 un gruppetto di 4 ind. ha trascorso tutto il mese in un incolto a Rovato (Pedrali A.); presumibilmente erano individui allontanatisi dai siti riproduttivi ubicati nelle aree xerothermiche sebene.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI DELL'ANNO 1989

PODICIPEDIDAE

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*: 1 ind. parzialmente albino (fig. 5) accompagnato da un altro in abito normale è stato ripetutamente osservato (il 9, 17 e 19 ottobre) al lido di Padenghe sul Garda (Rossi A.).

ARDEIDAE

Airone cenerino *Ardea cinerea*: 5 ind. avvistati nella R.N. Torbiere d'Iseo, il giorno 8 dicembre; il giorno 31 dello stesso mese erano ancora presenti (Busetto M., Galdi E., Mazzotti S.). Il 24 dicembre, presso l'allevamento ittico di Calvisano, il numero degli individui svernanti era di 90 (valore massimo), con una presenza giornaliera media di 59 (Gargioni A.).

CICONIIDAE

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*: il 1989 è stato un anno particolarmente ricco di avvistamenti durante la migrazione prenuziale: 6 ind., il 17 aprile, e altri 2, il 29 aprile, a Torbole Casaglia (Bertoli R., Rocco L.); il 17 aprile, 4 ind. vengono avvistati per la prima volta nel grande prato acquitrinoso costituito dall'alveo del laghetto temporaneo della Val di Bondo (Tremosine); a questi il giorno successivo se ne aggiungono altri 2, mentre il 22, 23 e 24 aprile è stata costante la presenza di 8



Fig. 5 - Svasso piccolo *Podiceps nigricollis albinotico*: Padenghe sul Garda, ottobre 1989 (foto Mutti G.).

ind. che usavano come posatoi due grandi alberi di *Castanea sativa*, presso l'abitato di Tremosine (Ghidotti B.). L'ultima segnalazione riguarda uno stormo di 13 ind., in volteggio, e poi in scivolata verso NE, a Desenzano il 12 maggio 1989 (Rossi A.).

ANATIDAE

Oca colombaccio *Branta bernicla*: osservato 1 ind. in volo il 10 novembre a Cadinano di Verolanuova (BRICHETTI P.). Le osservazioni di questa specie sono rare in tutta la Lombardia, inoltre questa è la prima segnalazione per la provincia di Brescia (BRICHETTI, 1982).

STERCORARIIDAE

Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*: 1 juv. raccolto il 21 ottobre a Verolavecchia, incapace di volare per ferite d'arma da fuoco (poi deceduto e donato al Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia) (Brichetti P.).

LARIDAE

Gabbianello *Larus minutus*: 2 ind. sul lago d'Iseo, presumibilmente svernanti, il 10 dicembre (Mazzotti S.). La presenza invernale della specie è sempre scarsa, soprattutto su questo lago.

Beccapesci *Sterna sandvicensis*: la prima segnalazione in tempi recenti riguarda l'avvistamento di 1 ind. in riposo su una grossa boa di segnalazione, il 18 settembre a Rivoltella del Garda (Rossi A.).

STRIGIDAE

Civetta nana *Glaucidium passerinum*: osservato 1 ind. a Ponte di Legno, il 30 dicembre, in un bosco misto di Pecci e Larici, a circa 1600 m (Brichetti P.).

UPUPIDAE

Upupa *Upupa epops*: il 26 febbraio è stato visto un gruppo di 4 ind. ricercare il cibo, assieme ad alcuni Storni *Sturnus vulgaris*, in un prato alla periferia di Gottomengo (Gargioni A.). La data è assai precoce per la provincia di Brescia, mentre tardiva è quella riguardante 1 ind. notato il 30 ottobre a Botticino (Chiari C.).

HIRUNDINIDAE

Rondine *Hirundo rustica*: 1 ind. in volo l'11 gennaio, lungo la costa gardesana a S. Felice del Benaco (Rossi A.).

BOMBYCILLIDAE

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*: circa 50 ind. sono stati presenti dal dicembre 1988 alla fine di gennaio 1989, presso Zone (Pedrali A.); un altro gruppetto (circa 15 ind.), nei dintorni di Pozzolengo, il 10 gennaio (Tacconi M.), mentre uno stormo consistente di 100-150 ind. ha svernato dalla fine di dicembre 1988 all'aprile 1989 in una valletta presso Agnosine (Rizzardini M.); il 23 aprile era ancora presente un gruppo di circa 10 ind. in spostamento verso E, sui monti di Tignale (Micheli A.). Le segnalazioni riguardanti quest'ultima invasione dell'autunno inverno 1988-89 concordano con quelle riportate in altre parti d'Europa (GEROUDET, 1989; AA.Vv.,

Tab. I - Elenco sistematico degli uccelli acquatici censiti nel gennaio 1989 nei maggiori bacini lacustri provinciali.

Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	27				
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	405	300		1	
Svasso coloroso <i>Podiceps grisegena</i>	5				
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	623				
Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	278				
Cigno reale <i>Cignus olor</i>	32				
Canapiglia <i>Anas strepera</i>	1				
Alzavola <i>Anas crecca</i>			25		
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>	6		30	69	5
Codone <i>Anas acuta</i>	1				
Moriglione <i>Aythya ferina</i>			22		
Moretta <i>Aythya fuligula</i>		1	43		
Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	4				
Smergo minore <i>Mergus serrator</i>	1				
Folaga <i>Fulica atra</i>	636	170	167		
	Lago di Garda	Lago di Iseo	Torbiere di Iseo	Lago di Idro	Lago di Valvestino

1989); le ultime apparizioni di una certa importanza nelle regioni dell'arco alpino erano avvenute nell'inverno 1975-76 (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

TURDIDAE

Tordela *Turdus viscivorus*: nel mese di ottobre si è verificata una copiosa migrazione di questa specie, come non si notava da anni: il 5 ottobre sono stati visti 18 ind. posati sullo stesso albero e altri 7 a terra presso la malga Casinello di Baremone, Anfo; il 12 ottobre erano ancora presenti, nel medesimo sito, 16 ind. (Cucchi P.).

SYLVIIDAE

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*: 1 ind. in canto nuziale spiegato per 5 minuti, udito il 10 ottobre, nella campagna presso l'abitato di Treviso Bresciano (Micheli A.).

CORVIDAE

Taccola *Corvus monedula*: il 31 dicembre contati 9 ind. nella piccola colonia insediata nel Castello di Sirmione (Barbieri G.), 4 ind. in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*: rilevato un raro caso di isabellismo in 1 ind. che presentava un'omogenea colorazione caffelatte: tale soggetto è stato ripetutamente osservato a Villachiara, nei pressi del F. Oglio, durante tutto l'anno (Bertoli R., Rocco L.).

EMBERIZIDAE

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus*: a conferma del quasi regolare transito della specie nel settore orientale della nostra provincia, 3-4 ind. sono stati osservati a metà novembre nella campagna presso Pozzolengo (Tacconi M.).

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1989 - *European news. British birds*, 82 (7): 329.
BRICHETTI P., 1982 - *Uccelli del Bresciano*. Amm. Prov. di Brescia.
BRICHETTI P. e CAMBI D., 1990 - *Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia*. Monografie di Natura Bresciana, 14: 1-111.
GEROUDET P. (a cura di), 1989 - *Chronique ornithologique romande. L'automne 1988 et l'hiver 1988-89*. Nos oiseaux, 40 (4): 238.

Indirizzo degli Autori:

ALESSANDRO MICHELI, via Roma 8 - 25070 TREVISO BRESCIANO (Brescia)
MAURIZIO Busetto, via Alighieri 30 - 25062 CONCESIO (Brescia)