

**RICONFERMA PER LA RISERVA NATURALE
TORBIERE DEL SEBINO
DELLA NIDIFICAZIONE DI INTERESSANTI SPECIE E
PRESUNTA NIDIFICAZIONE DI SCHIRIBILLA
(*Porzana Parva*)**

A seguito di regolari osservazioni effettuate nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino nel corso delle stagioni riproduttive 1992-1993 abbiamo riconfermato la nidificazione di interessanti specie che hanno colonizzato la Riserva nel 1991. Queste ulteriori nidificazioni confermano le notevoli potenzialità delle Torbiere per la nidificazione degli uccelli acquatici.

Gabbiano comune *Larus ridibundus*: durante ricerche condotte nel 1991 ne abbiamo accertato la nidificazione di 2 coppie (MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1991). Nel 1992 i Gabbiani comuni hanno nuovamente nidificato, insediandosi sugli isolotti occupati nel 1991, con 3 coppie: la prima ha iniziato la costruzione del nido l'1 maggio 1992, ha deposto 2 uova che ha cominciato ad incubare il 14-16 maggio, la schiusa è avvenuta l'11 giugno; l'unico pullus nato è sopravvissuto solo per una settimana. La seconda coppia ha costruito ben 3 nidi sempre nella stessa zona, distanti tra loro da un minimo di 6 ad un massimo di 30 m, ma sempre senza portare le uova alla schiusa. La terza coppia ha iniziato la costruzione del nido il 9 maggio 1992 sfruttando come supporto una toppa d'erba a ridosso di un fragmiteto, l'inizio dell'incubazione delle 3 uova deposte è avvenuto il 22-23 maggio; il 3 luglio il nido veniva abbandonato con le uova, presumibilmente per le persistenti piogge di giugno. Anche nel 1992 purtroppo non ci sono stati involi, ma la specie sembra rafforzare gli effettivi nidificanti. Anche nel 1993, 2 coppie hanno costruito 4 nidi anche se non sono poi stati osservati involi.

Airone rosso *Ardea purpurea*: abbiamo accertato la prima nidificazione della specie nella torbiera nel 1991 (MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1992a). Nel 1992 si riconferma la nidificazione di una sola coppia con il nido posto sempre nel fragmiteto dell'anno precedente; sono state deposte 4 uova in giugno che si sono schiuse circa il 20 luglio; l'involto è avvenuto il 10 settembre. Nel 1992 si è registrato un notevole successo riproduttivo, con l'involto di tutti i 4 giovani nati. Anche nel 1993 2 coppie hanno nidificato sicuramente, mentre 1 terza è solo probabile; si sono involati 7 pulli.

Cigno reale *Cygnus olor*: già da diversi anni sul lago d'Iseo e nelle Torbiere venivano rilasciati dei Cigni reali, ma per cause facilmente intuibili dopo brevi periodi sparivano. L'anno scorso (1991) abbiamo trovato per la prima volta una coppia nidificante allo stato selvatico (MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1992b) nelle Torbiere del Sebino in località «Lamette». Nello stesso anno una seconda coppia ha portato a termine una covata, non documentata perché osservata troppo tardi già con 8

piccoli in acqua, tutti sopravvissuti. Nel 1992 ha nidificato solo una coppia (quella seguita nel 1991) ancora sul medesimo isolotto; già verso la metà di marzo il maschio sembrava costruire il nido strappando materiale di ogni tipo come carici, alghe, cannuce, ecc. e posandolo sull'isolotto che sarebbe poi stato destinato alla costruzione del nido; l'inizio dell'incubazione è avvenuto il 7 aprile e la schiusa il 7 maggio, con 7 pulli portati all'involto. Nelle osservazioni invernali effettuate nel gennaio 1993 erano presenti 22 individui, tutti volanti, tranne uno dei maschi capostipiti con l'ala destra tarpata. Nel 1993 la specie ha nidificato sia nelle «Lamette» che nella «Lama»: dai 2 nidi sono usciti rispettivamente almeno 7 e 3 pulli.

Schiribilla *Porzana parva*: già da qualche anno notavamo nella Torbiera in località «Lama» alcuni individui di Schiribilla, senza osservare comportamenti che lasciasse presumere una nidificazione, che però ritenevamo probabile. Nel 1992 abbiamo osservato una coppia di Schiribille in atteggiamento territoriale e di corteggiamento. La coppia aveva preso possesso di una lingua di terra con copertura a *Phragmites australis* e *Amorpha fruticosa* dove è stata ripetutamente osservata in vari atteggiamenti di corteggiamento per oltre 3 settimane, dalla fine di aprile alla metà di maggio. I due individui, quando si alimentavano, intercalavano la ricerca del cibo con brevi voli radenti e si posavano sugli steli delle canne. Ad ogni incontro i due partners si sfioravano con il collo ed il resto del corpo, presumibilmente per rinsaldare il legame di coppia.

Successivamente non abbiamo potuto continuare la ricerca, perché impegnati con altre specie ornitiche. Il comportamento osservato lascerebbe presumere una nidificazione. Oltre alla coppia citata nella zona erano presenti uno o forse due altri individui.

B I B L I O G R A F I A

- MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1991 - Nidificazione di Gabbiano comune (*Larus ridibundus*) nella Riviera Naturale Torbiere del Sebino. Riv. Ital. Orn., 61 (3-4): 125-126.
MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1992 - Prima nidificazione accertata di Airone rosso (*Ardea purpurea*) nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). Natura Bresciana, 27: 309-310.
MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1992 - Prima nidificazione allo stato selvatico del Cigno reale (*Cygnus olor*) sul lago d'Iseo (Brescia). Natura Bresciana, 27: 311.

MAZZOTTI SERGIO
via Monauni 25
25030 COCCAGLIO (Brescia)

MAZZOTTI FRANCO
via Umberto I 18
25033 COLOGNE (Brescia)