

ARTURO GARGIONI* e AGOSTINO PEDRALI*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1995

RIASSUNTO - Prosegue nel 1995 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate. Le specie segnalate sono 28.

SUMMARY - 1995 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This sixth report considers the more interesting ornithological record (28) of 1995, in the province of Brescia (Northern Italy). The information already published in other scientific journal are not reported.

PREMESSA

In questo resoconto vengono presi in considerazione i dati relativi alle specie nidificanti: prime nidificazioni, specie rare, altimetrie inconsuete e tutti quei dati non considerati nell'Atlante provinciale dei nidificanti e nel relativo aggiornamento.

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o comuni, successivi all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie pubblicate su riviste specialistiche.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al recente lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI, 1994). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni: Roberto Bertoli (Torbole Casaglia), Pierandrea Brichetti (Verolavecchia), Mario Caffi (Borgo S. Giacomo), Stefania Capelli (Nave), Gianbattista Compagnoni (Bedizzole), Pieralberto Cucchi (Barghe), Arturo Gargioni (Gottolengo), Marco Gobbi (Paitone), Sergio Mazzotti (Coccaglio), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano), Attilio Mutti (Desenzano), Mario Rizzardini (Agnosine), Leo Rocco (Collebeato), Alessandro Rossi (Desenzano).

* GRA, Gruppo Ricerche Avifauna.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PODICIPEDIDAE

Svasso cornuto *Podiceps auritus*: un individuo in parziale livrea nuziale e con una evidente infezione alla base del becco, dovuta presumibilmente ad un amo da pesca, è stato osservato il 7 aprile dal lungolago antistante Sirmione. Un secondo individuo in livrea invernale, era presente nella stessa località imbrancato con circa 30 Svassi piccoli *Podiceps nigricollis*, il 10 dello stesso mese (Rossi A.). Mentre gli avvistamenti precedenti si riferiscono al periodo autunno-invernale (Busetto e Micheli, 1993; Busetto e Gargioni, in stampa e Gargioni e Pedralli, in stampa), è questo il primo caso accertato della presenza della specie durante la migrazione prenuziale.

PHALACROCORACIDAE

Cormorano *Phalacrocorax carbo*: estivazione regolare di 5 individui sul Lago di Garda (Rossi A.). Casi di individui estivanti sono noti anche per gli anni precedenti (Mutti A. com. pers.).

ARDEIDAE

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*: un individuo in abito giovanile è stato osservato in alimentazione il 20 ottobre nella R. N. Torbiere del Sebino (Gargioni A.). Si tratta certamente di un migratore tardivo.

Airone cenerino *Ardea cinerea*: circa 40 individui hanno stazionato da settembre a dicembre presso il laghetto artificiale adiacente il casello autostradale di Brescia centro, tav. I.G.M. 47 I SO (Rocco L.).

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: anche se negli ultimi anni l'avvistamento di questa specie è stata quasi sempre regolare in provincia, è interessante una sua prolungata presenza nella R. N. Torbiere del Sebino: un ind. la prima settimana di aprile; un'altro ind. la terza di agosto e 2 ind. la terza di settembre (Capelli S., Mazzotti S.).

CICONIDAE

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*: un individuo ha sostato il 9 e il 10 marzo in località "la Rocca di Nozza" a Vestone, a 315 m s.l.m. in un ambiente di bosco rupestre (Cucchi P.). È il primo avvistamento documentato della specie per la Val Sabbia.

ANATIDAE

Anatra mandarina *Aix gareliculata*: un individuo imbrancato con Germani reali *Anas platyrhynchos* era presente il 14 gennaio sul Lago d'Iseo presso Pilzone (Brichetti P., Caffi



Fig. 1 - Svasso cornuto *Podiceps auritus*, in parziale livrea nuziale, si può notare un' infezione che dalla base del becco arriva sotto l'occhio (A. Rossi).



Fig. 2 - Giovane di Fischione turco *Netta rufina* nato presso Sirmione nel 1994 (A. Rossi).

M.). Questa segnalazione certamente attribuita a un individuo introdotto, fa pensare a un'origine non naturale anche di buona parte degli individui già segnalati precedentemente in provincia.

Volpoca *Tadorna tadorna*: una femmina era presente il 21 dicembre in una tesa da caccia nella campagna di Pompiano: tav. I.G.M. 47 III NO (Mazzotti S.). Per la provincia è considerata migratrice regolare e svernante irregolare (BRICHETTI, 1994).

Fistione turco *Netta rufina*: a riconferma della prima nidificazione accertata della specie per la provincia (GARGIONI *et al.*, 1995), due coppie si sono riprodotte con 6 e 11 pulli nei canneti presso Sirmione sul Lago di Garda. La presenza di una femmina con un piccolo al seguito nei primi giorni di agosto, fa ipotizzare la nidificazione tardiva di una terza coppia (Mutti A., Rossi A.). Anche per il Lago d'Iseo sembra che la specie stia diventando più regolare, con la presenza di una coppia dall'inizio di febbraio fino alla fine di maggio (Capelli S., Mazzotti S.).

Tab. 1 - Elenco sistematico degli uccelli acquatici (compresi *Phalacrocorax carbo* e *Ardea cinerea*), censiti nel gennaio 1995 nei maggiori bacini lacustri bresciani.

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo
Strolaga minore <i>Gavia stellata</i>	2		
Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i>	7	3	
Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	2	7	
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	661	1.304	
Svasso collarosso <i>Podiceps grisegena</i>		2	
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	2.086	1	
Cigno reale <i>Cygnus olor</i>	210	35	
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>		6	166
Mestolone <i>Anas clypeata</i>			1
Moriglione <i>Aythya ferina</i>		40	35
Moretta <i>Aythya fuligula</i>			35
Orco marino <i>Melanitta fusca</i>	16		
Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	3		
Folaga <i>Fulica atra</i>	4.128	907	160
Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	460		216
Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i>	18		8

ACCIPITRIDAE

Nibbio reale *Milvus milvus*: un individuo osservato in volo il 17 marzo proveniente da sud, in località “Muslone” di Gargnano, a 650 m s.l.m., in una zona che presentava alte pareti calcaree con alla base un bosco di orniello e roverella (Bertoli R.). Per la provincia è considerato migratore irregolare e scarso (BRICHETTI, 1994), con 6 avvistamenti negli ultimi vent’anni.

FALCONIDAE

Falco pellegrino *Falco peregrinus*: due juv. sono stati ripetutamente osservati durante l’ultima decade di settembre sulle pendici del Monte della Madonnina, prospiciente le Torbiere d’Iseo (Ballerio G., Capelli S. e Mazzotti S.). Un terzo individuo è stato a lungo osservato il 10 dicembre, posato in un campo arato e sopra una grossa farnia, in località “S. Maria degli Angeli” a Pralboino, 61 I NO (Gargioni A.). Mentre per le zone collinari gli avvistamenti si fanno più regolari, per la bassa pianura bresciana non sono note segnalazioni invernali. Si ricorda la cattura di una femmina presso Casalmoro (MN), al confine con la nostra provincia (Barbieri G. com. pers.).

RALLIDAE

Re di quaglie *Crex crex*: segnalato un individuo in canto il 14 maggio a circa 330 m s.l.m., in un ambiente prativo umido di fondovalle, in località “Segrèr” presso Agnosine (Rizzardini M.). Storicamente nidificante, nonostante le scarse segnalazioni per la provincia, è considerato migratore regolare (BRICHETTI, 1994). Negli ultimi anni la specie appare in progressiva ripresa, visto il moltiplicarsi delle segnalazioni e delle nidificazioni accertate in regioni limitrofe come il Veneto. Specie erroneamente ritenuta tipica della pianura, può invece nidificare fino a 1.400 m s.l.m. (FARRONATO *et. al.*, 1989).

CHARADRIIDAE

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*: due individui erano presenti con altri limicoli il 28 agosto in una tesa per anatidi presso Pavone Mella (Gargioni A.). Anche se considerato migratore regolare per la provincia, scarse sono le segnalazioni di questo caradriforme tipico delle zone costiere.

SCOLOPACIDAE

Pittima minore *Limosa lapponica*: un individuo in abito giovanile è stato osservato dall’11 al 15 settembre in alimentazione lungo una spiaggia del Lago di Garda presso Sirmione (Rossi A.). Il basso livello del lago può favorire la sosta migratoria di specie poco comuni per la provincia.

LARIDAE

Tab. 2 Censimento del 15 gennaio 1995 del Gabbiano comune *Larus ridibundus* svernante in provincia di Brescia:

Lago d'Iseo	15.407 ind. (rientro serale ai dormitori più i presenti durante il giorno)
Lago di Garda	22.174 ind. (rientro serale ai dormitori)
	1.452 ind. (presenti durante il giorno)
	293 ind. (Gavine + Gabbiani reali presenti durante il giorno)
Lago d'Idro	non censito
Totale	39.326 individui censiti

ALCENIDIDAE

Gruccione *Merops apiaster*: a conferma di una generale espansione della specie nella Pianura Padana e anche nella nostra provincia, va segnalata la nidificazione (con esito negativo), di una (forse due) coppie, in una cava in attività presso Fiesse, Tav. I.G.M. 61 I SO (Gargioni A.). Inoltre, 15 individui sono stati osservati in transito nella prima metà di settembre nelle Torbiere del Sebino (Capelli S.).

HIRUNDINIDAE

Balestruccio *Delichon urbica*: come segnalato nel precedente resoconto (GARGIONI e PEDRALI, in stampa), anche quest'anno la specie è stata osservata in migrazione precoce: 12 individui in transito lungo il Fiume Chiese il 25 febbraio. Un individuo ispezionava il nido presso una colonia a Visano, distante soli 2 Km dal luogo del primo avvistamento il 28 dello stesso mese (Gargioni A.).

Rondine *Hirundo rustica*: due individui sono stati ripetutamente osservati dal 14 al 28 gennaio lungo le sponde del Lago d'Iseo fra gli abitati di Sarnico e Paratico (Bertoli R., Bricchetti P., Caffi M. e Mazzotti S.). Già in passato si sono avuti casi di presenze invernali della specie sui due maggiori laghi (MICHELI e Busetto, 1991; Busetto e MICHELI, 1993).

MOTACILLIDAE

Calandro *Anthus campestris*: un individuo osservato il 10 maggio alla "Bocca di Cablone" presso Magasa, a 1.490 m s.l.m., in ambiente a prateria alpina con lembi di sterrato (Cucchi P.). In assenza di atteggiamenti canori, l'individuo è da ritenersi un migratore tardivo. La specie nidifica nell'area Valsabbina con 1-2 coppie sul monte "Corna di Savallo" (CAMBI e MICHELI, 1986).

TURDIDAE

Monachella *Oenanthe hispanica*: osservati un maschio ed un juv. durante i mesi di giugno e luglio in una cava di marmo in attività nel vallone del Rio Rudone presso Paitone (Compagnoni



Fig. 3 - Pittima minore *Limosa lapponica* in abito giovanile fotografata in alimentazione presso Sirmione (A. Mutti).

GB., Gobbini M.). Tale presenza conferma la regolarità della nidificazione nell'unico areale riproduttivo conosciuto in Lombardia (BRICHETTI in BRICHETTI e FASOLA, 1990).

Merlo dal collare *Turdus torquatus*: nuovi siti di svernamento per l'alto Garda, con segnalazioni di singoli individui in località "Cordetèr" il 2 gennaio a 1.470 m s.l.m., (35 III NE) e in località "Vesta di Cima" di Gargnano (35 III SE) il 12 gennaio a 1.380 m s.l.m. In entrambi i casi, gli individui erano in bosco misto di latifoglie e abete rosso, imbrancati con Cesene *Turdus pilaris* (Cucchi P.). I casi accertati di svernamento nella regione alpina sono scarsi e di non facile attribuzione sottospecifica.

SYLVIIDAE

Usignolo di fiume *Cettia cetti*: un individuo è stato sentito in canto in primavera e successivamente il 22 ottobre, fra la bassa vegetazione ripariale lungo il fiume Chiese a 380 m s.l.m. in località "Refi" di Ponte Caffaro, tav. I.G.M. 35 III NE (Rizzardini M.). In Italia la specie nidifica regolarmente nei luoghi adatti della bassa pianura, con individui che si spingono fino a 900-1.000 m s.l.m. Per la nostra provincia è questa la quota più elevata finora riscontrata.

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*: un individuo in canto è stato osservato il 30 aprile in un cespuglio nella campagna coltivata presso Monticelli Brusati (Mazzotti S.). Il dato conferma la regolare presenza della specie come migratrice nel settore occidentale della provincia, come recentemente riportato in letteratura (VEZZOLI, 1994).

Bigiarella *Sylvia curruca*: un maschio è stato osservato in canto somnesso il 3 giugno in località "Camisino" a Capovalle a 900 m s.l.m., in una boscaglia termofila con pino silvestre (Micheli A.). Trattasi certamente di un migratore tardivo anche se nell'area sono state recentemente censite delle nidificazioni (BRICHETTI, 1992).

MUSCICAPIDAE

Balia nera *Ficedula hypoleuca*: il 31 luglio vengono segnalati numerosi individui nelle campagne di Treviso Bresciano in località "Remès" a 900 m s.l.m. (Micheli A.). Lo stesso fenomeno viene riscontrato sul Monte Orfano dove, nello stesso periodo erano presenti numerosissimi individui (Pedrali com. pers.). Trattasi verosimilmente di una "invasione" di migratori precoci.

TIMALIIDAE

Basettino *Panurus biarmicus*: viene riconfermata la nidificazione con 3/4 coppie nelle "lamette" della R.N. Torbiere del Sebino, 47 IV NO (Bertoli R., Rocco L.). Il primo caso accertato di nidificazione per la provincia si è avuto nel 1994, sempre nelle "lamette" (BERTOLI e ROCCO, com. pers.), in precedenza la nidificazione era ritenuta possibile fin dal 1985 (BRICHETTI, 1992).

CORVIDAE

Taccola *Corvus monedula*: accertata la nidificazione di due coppie a Desenzano, tav. I.G.M. 48 III NO (Rossi A.). Precedentemente per la località era nota la sola presenza di individui in periodo riproduttivo (BRICHETTI, 1992).

Cornacchia nera *Corvus corone corone*: due individui sono stati osservati nella R.N. Torbiere del Sebino il 14 gennaio (Brichetti P., Caffi M.). Sottospecie tipica delle quote medio-alte, raramente si rinviene nella bassa pianura e il basso Sebino rappresenta il limite inferiore di svernamento in provincia.

EMBERIZIDAE

Zigolo nero *Emberiza cirulus*: un individuo in canto è stato osservato il 28 maggio e il 12 luglio presso Collebeato, in un frutteto abbandonato con alberi radi e cespugli di rosa canina (Rocco L.). Viene quindi riconfermata la nidificazione probabile per questa tavoletta (47 IV NE).

B I B L I O G R A F I A

- BRICHETTI P., 1992 - *Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991*. Natura Bresciana, 27: 201-221.
- BRICHETTI P., 1994 - *Situazione dell'avifauna della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornamento 1993*. Natura Bresciana, 29: 221-249.
- BRICHETTI P. e FASOLA M., 1990 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia (1983-1987)*. Editoriale Ramperto, Brescia: 241 pp.
- BUSETTO M. e MICHELI A., 1993 - *Resoconto ornitologico bresciano 1991*. Natura Bresciana, 28: 423-428.
- CAMBI D. e MICHELI A., 1986 - *L'avifauna nidificante della "Corna di Savallo" (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento e ecologia*. Natura Bresciana, 22: 103-178.
- FARRONATO M., FRACASSO G., 1989 - *Nidificazione del Re di quaglie *Crex crex*, in provincia di Vicenza*. Riv. ital. Orn., 59: 196-200.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998 - *Resoconto ornitologico bresciano 1994*. Natura Bresciana, 31: 249-258.
- GARGIONI A., MUTTI A. e ROSSI A., 1995 - *Nidificazione di *Fistione turco*, *Netta rufina*, sul Lago di Garda (Lombardia)*. Riv. ital. Orn., 65: 83-85.
- MICHELI A. e BUSETTO M., 1991 - *Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989*. Natura Bresciana, 26: 239-249.
- VEZZOLI D., 1994 - *Presenza regolare del Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*, durante la migrazione primaverile in Franciacorta (Brescia)*. Natura Bresciana, 29: 303-304.

Indirizzo degli Autori:

ARTURO GARGIONI, vill. Incidella - 25023 Gottolengo (Brescia).

AGOSTINO PEDRALI, via don L. Sturzo 21 - 25030 Coccaglio (Brescia).