

RESOCONTO ORNITOLOGICO DEL GRUPPO RICERCHE AVIFAUNA MANTOVANO 2001-2002

DANIELE LONGHI¹, NUNZIO GRATTINI¹

Parole chiave – Segnalazioni ornitologiche, Provincia di Mantova

Key words – Ornithological report, province of Mantua

Riassunto – Vengono presentate le osservazioni più interessanti raccolte dal Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano, relative agli anni 2001-2002. Sono escluse le segnalazioni già pubblicate sulle riviste specialistiche. Le specie segnalate sono 26 di cui 19 Non-Passeriformi (compresa *Gru coronata*) e 7 Passeriformi.

Abstract – 2001-2002 ornithological report for the province of Mantova (Northern Italy). This first report considers the most interesting ornithological records concerning the period from 2001 to 2002 in province of Mantova (Northern Italy). The information already published in other scientific journal are not reported.

PREMESSA

I metodi adottati sono in accordo con i resoconti precedentemente pubblicati dal bresciano e sono state considerate:

- specie accidentali, rare o scarse sul territorio provinciale;
- specie non comuni in pianura che sembrano aumentate rispetto al passato;
- specie comuni, ma presenti con un numero inconsueto di individui;
- nidificazioni rare o occasionali sul territorio provinciale;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o con un piumaggio anomalo;
- specie esotiche.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito al resoconto, fornendo le proprie osservazioni: Egidio Bacchi (Pegognaga), Nunzio Grattini (Pegognaga), Daniele Longhi (Sustinente), Federico Novelli (Casteldario), Gastone Pivatelli (Bergantino), Giuseppe Tenedini (Gazoldo degli Ippoliti).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

GAVIIDAE

Strolaga minore *Gavia stellata*: un individuo ha so-

stato dall'1 al 6 dicembre 2001 in una cava da pesca del Parco San Lorenzo (Grattini N.). Un juv. ha sostato dal 12 al 16 novembre 2002 nel Canalbianco presso Sustinente (Longhi D.). Rari sono gli avvistamenti della specie nella provincia.

ARDEIDAE

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*: il 2 dicembre 2001 sono stati osservati circa 100 individui in alimentazione nei campi di erba medica circostanti la "Vallazza", in località Pietole (Longhi D., Novelli F.). Un gruppo di 165 individui ha sostato da fine novembre al 10 dicembre 2001 nell'area del Parco San Lorenzo presso Pegognaga (Grattini N.). Questa è certamente la più grossa concentrazione di guardabuoi osservata nel mantovano a sud del Po. Gli aironi hanno abbandonato l'area dopo una copiosa nevicata. La specie è in aumento nel territorio mantovano; durante l'inverno 2000-01 sono stati conteggiati oltre 400 individui in 5 dormitori (MAFFEZZOLI e GRATTINI, *in stampa*).

CICONIIDAE

Cicogna nera *Ciconia nigra*: un individuo è stato osservato in volo lungo il Po in località Libiola il 13 luglio 2002 (Longhi D.). Tre individui sono stati osservati in volo il 14 agosto 2002 lungo il Po presso Suzzara (Grattini N., Bacchi E.). Il 5 settembre 2002 sono stati avvistati due individui in volo alla Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (Novelli F.). Le osservazioni della specie negli ultimi anni, in particolare lungo il corso del Po, sono diventate frequenti; precedentemente la

¹ Gruppo Ricerche Avifauna Mantovano (GRAM), via Monteverdi 73, 46033 Casteldario, Mantova

specie era considerata accidentale (G.M.O. *in prep.*).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*: un individuo è stato avvistato il 20 settembre 2001 lungo il Po presso Villa Saviola (Bacchi E.). Il 18 aprile 2002 (Longhi D.) e il 5 maggio 2002 (Novelli F.), alla Ris. Nat. Paludi di Ostiglia, sono stati osservati rispettivamente 1 e 5 individui in volo migratorio con direzione est-ovest. Due gli avvistamenti nel mese di settembre 2002: il primo il 10 settembre lungo il Po presso Villa Saviola (Bacchi E.) e il secondo sempre lungo il Po, in località Sustinente, l'11 settembre (Longhi D.). Le segnalazioni della specie negli ultimi anni sono diventate frequenti, in modo particolare lungo il corso del principale fiume italiano.

ANATIDAE

Marzaiola *Anas querquedula*: sono stati osservati un maschio e una femmina l'1 giugno 2002 all'interno della Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (Longhi D., Novelli F.). La specie nel mantovano si è riprodotta occasionalmente; tale osservazione è quindi da ritenersi interessante nel contesto provinciale.

Fistione turco *Netta rufina*: una femmina, rispettivamente il 31 luglio e il 17 agosto 2001, è stata osservata nella Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (Longhi D., Novelli F.). Una femmina è stata osservata il 16 settembre 2001 in una cava artificiale del Parco San Lorenzo (Grattini N.). Nell'ultimo decennio le segnalazioni riguardanti la specie si sono intensificate, confermando quanto riscontrato nel bresciano (GARGIONI e PEDRALI, 1995).

Smergo maggiore *Mergus merganser*: anche negli inverni 2000-01 e 2001-02 è continuata la sosta invernale degli smerghi (da 30 a 60 giorni) nelle cave del Parco sovracomunale San Lorenzo; dal 1994 sostano regolarmente 1-3 ind. (Grattini N.). Molto sensibile al disturbo antropico, durante il giorno gli individui compiono vari spostamenti nelle cave artificiali presenti nel basso mantovano.

ACCIPITRIDAE

Biancone *Circaetus gallicus*: un individuo è stato osservato in volo insieme a due Falchi pecchiaioli lungo il Po in località Portiolo (Grattini N.). Le osservazioni della specie nella bassa pianura mantovana sono molto rare.

Albanella minore *Circus pygargus*: una coppia di Albanella minore si è riprodotta all'interno della Ris.

Nat. Paludi di Ostiglia nel 2001 e nel 2002 (Grattini N., Longhi D., Novelli F.); trattasi della terza nidificazione accertata nel mantovano. La specie negli ultimi anni appare altresì aumentata durante i periodi migratori.

FALCONIDAE

Smeriglio *Falco columbarius*: il 17 novembre 2002, nell'area Ris. Nat. Paludi di Ostiglia, sono stati osservati 22 individui di Smeriglio posati in un campo (Longhi D., Novelli F.). In provincia durante l'inverno 2001-02 è stato localizzato nelle Valli del Mincio un roost di 25 individui (MAFFEZZOLI e MANTOVANI, *in stampa*).

RALLIDAE

Schiribilla grigiata *Porzana pusilla*: un individuo ha sostato nel mese di settembre 2002 in una piccola cava naturalizzata all'interno del Parco San Lorenzo (Grattini N., Pivatelli G.); sembra essere la prima osservazione certa della specie nella provincia, anche se controlli più accurati potrebbero evidenziare un passaggio regolare sul territorio mantovano.

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: un individuo ha sostato dal 6 al 18 aprile 2002 nella Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (Novelli F., Grattini N.); mentre un individuo è stato osservato in veleggio, nella stessa riserva, il 28 aprile 2002 (Longhi D.). La specie in passato era ritenuta accidentale ma negli ultimi anni gli avvistamenti si sono intensificati; a questo probabilmente contribuisce anche una migliore copertura del territorio provinciale da parte di un maggior numero di rilevatori.

HAEMATOPODIDAE

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*: due individui sono stati osservati il 5 agosto 2002 in una lanca del fiume Po presso Sustinente (Longhi D.). La specie è da considerarsi accidentale per la provincia, anche se rilevamenti più frequenti in particolare lungo il corso del Po, potrebbero aumentarne gli avvistamenti.

CHARADRIIDAE

Pivieressa *Pluvialis squatarola*: in data 8 ottobre 2002 due individui sono stati osservati in una lanca del Po presso Sustinente (Longhi D.). La specie è rara nel mantovano.

STERNIDAE

Sterna maggiore *Sterna caspia*: di comparsa accidentale in passato, tre le osservazioni nel 2002: lungo il Po (1 ind.); lungo il Mincio (4 ind.); e in cave artificiali del basso mantovano (2 ind.) (Grattini N.). Di conseguenza in futuro potrebbe mutare la fenologia della specie da accidentale a migratrice regolare, anche se scarsa.

Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*: il 7 dicembre 2002 un individuo adulto è stato osservato sul fiume Po, in località San Giacomo Po (Longhi D.). Sembra essere la prima segnalazione invernale nella provincia e una delle poche in Italia.

APODIDAE

Rondone pallido *Apus pallidus*: Il 10 novembre 2002 è stato osservato in volo, in località Boccadiganda, un individuo di Rondone pallido (Grattini N., Bacchi E.). In tardo autunno è la prima segnalazione nota nel mantovano e una delle poche in Italia.

PICIDAE

Picchio verde *Picus viridis*: due individui sono stati avvistati regolarmente dal 2000 nell'area del Parco San Lorenzo e nel 2002 il canto del Picchio verde è stato udito da marzo a maggio nelle siepi circostanti il parco, dove potrebbe essere avvenuta la nidificazione (Grattini N.). Nell'ultimo decennio gli avvistamenti del *Picidae* nella bassa pianura mantovana erano diventati rarissimi.

MOTACILLIDAE

Ballerina bianca *Motacilla alba*: nell'inverno 2000-01 all'interno di uno stabilimento industriale a Gazzo degli Ippoliti, si è formato un dormitorio composto da 124 Ballerine bianche, tra cui una albina (Grattini N., Tenedini G.). Sembra essere il primo dormitorio accertato di Ballerina bianca nel mantovano. Nell'inverno 2001-02, all'interno di un campo arato in località Casteldario, sono state avvistate più volte verso sera un centinaio di individui posati sul terreno; il dormitorio non è stato localizzato (Novelli F.). La specie in inverno tende a formare dormitori comuni (GATTO, 1985).

TURDIDAE

Pettazzurro *Luscinia svecica*: diversi gli avvistamenti avvenuti negli ultimi anni in varie località della provincia: Ris. Nat. Paludi di Ostiglia; Parco San Lorenzo; Torbiere di Marcaria (Grattini N., Novelli

F.). A conferma di ciò numerosi sono gli individui catturati e inanellati dal gruppo NISORIA all'interno della Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (PESENTE & MARAGNA, 1996). Con questi nuovi dati la specie nel mantovano potrebbe essere considerata migratrice regolare.

REMIZIDAE

Pendolino *Remiz pendulinus*: un maschio nel mese di settembre 2001 ha costruito un nido su un salice in una cava da pesca presso Pegognaga (Grattini N.). Anche se non è avvenuta la riproduzione (forse a causa di un prolungato periodo di maltempo con pioggia e vento) la costruzione del nido in tale periodo è poco frequente.

CORVIDAE

Taccola *Corvus monedula*: negli ultimi anni sono diventate più frequenti le osservazioni della Taccola durante i periodi migratori. Nell'inverno 2001-02 un centinaio di individui ha svernato in comune di S. Benedetto Po utilizzando come dormitorio un pioppeto coltivato (Grattini N.). La fenologia della specie nel mantovano è ancora poco conosciuta.

Cornacchia nera *Corvus corone corone*: un individuo, associato a Cornacchie grigie, è stato osservato il 27 ottobre 2002 presso Ostiglia in mezzo a stoppie di mais (Grattini N., Longhi D., Novelli F.). Sottospecie tipica delle quote medio alte; gli avvistamenti nella bassa pianura mantovana sono occasionali, anche se più frequenti negli ultimi inverni.

Cornacchia nera X Cornacchia grigia: il 9 novembre 2002 lungo un argine golenale del Po presso Suzzara, è stato avvistato in alimentazione un individuo di Cornacchia nera X Cornacchia grigia (Grattini N.). Sono sempre più frequenti le osservazioni di ibridi di cornacchia nella bassa pianura.

STURNIDAE

Storno *Sturnus vulgaris*: un individuo albino è stato osservato nel mese di giugno 2002 lungo il Canalbianco nei pressi della Ris. Nat. Paludi di Ostiglia (Longhi D.).

Storno roseo *Sturnus roseus*: l'1 e il 12 giugno 2002 nella Ris. Nat. Paludi di Ostiglia è stato osservato in volo un gruppo composto da 15 individui (Longhi D., Novelli F.). Sembrano essere le prime osservazioni della specie in provincia.

Esotica esclusa

Gru coronata *Balearica regulorum*: un individuo è stato avvistato e fotografato con regolarità dall'1 giugno all'11 dicembre 2002 nei campi circostanti la

Ris. Nat. Paludi di Ostiglia. L'animale è risultato privo di anelli e ha dimostrato un comportamento piuttosto diffidente, con una distanza di fuga superiore ai 150-200 m.

BIBLIOGRAFIA

GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1995. *Natura Bresciana* 31: 259-268.

GATTO A., 1985. Dormitorio di Ballerina bianca, Motacilla alba. *Uccelli d'Italia*, 10: 38-41.

G. M. O. (Gruppo Mantovano di Ornitologia), in preparazione. *Bollettino ornitologico mantovano*. Anni 1993-1998.

MAFFEZZOLI L. e MANTOVANI S., Dati preliminari sulla consistenza di un roost invernale di Smeriglio, Falco columba-

rius nella Riserva Naturali Valli del Mincio. *Avocetta*, in stampa.

MAFFEZZOLI L. e GRATTINI N., Ardeidae svernanti in provincia di Mantova (generi *Bubulcus*, *Egretta*, *Casmerodius*), *Picus*, in stampa.

PESENTE e MARAGNA., 1996. Primi dati su migrazione e fenologia in periodo autunnale del Pettazzurro, *Luscinia svecica*, presso la palude del Busatello (*Veneto-Lombardia*). *Riv. ital. Orn.* 66: 137-140.